

IMÁGENES DE INTERÉS

Síndrome de Gorham-Stout en miembros inferiores.

Moreno Rodríguez, Ana M.

DUE. Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

CORRESPONDENCIA: am12121212@hotmail.com

El síndrome de Gorham-Stout o “síndrome del hueso fantasma”, es una enfermedad rara, de etiología y patogenia desconocida.

Se caracteriza por una osteolisis masiva localizada y espontánea, rápidamente progresiva, asociada con una proliferación local de vasos pequeños linfáticos o vasculares de etiología benigna, donde es representativa una destrucción progresiva del hueso y la ausencia de nueva formación ósea. Se han descrito menos de 200 casos en la literatura.

Se presenta el caso de una mujer de 51 años, diagnosticada desde hace 10 años de Osteolisis Esencial Masiva, que ingresa en la Unidad de Hospitalización de Cirugía de Traumatología y Ortopedia, por una fístula de larga evolución para biopsia - no se observaron signos histológicos de malignidad. Posteriormente se realizó la amputación infrarrotuliana del miembro inferior izquierdo en 2007.

En las radiografías simples, se pueden observar áreas radiotransparentes subcorticales e intramedulares y se evidencia la pérdida de la densidad y desaparición ósea.

Bibliografía

- 1: Cano B, Insa S, Cifrian C, Cortina H, Hernandez M. Radiologic findings in Gorham-Stout syndrome. Radiologia. 2006 Jan-Feb;48 (1):33-6.
- 2: Gorham L.W.; Wright A.W.; Shultz H.H. et al. Dissaparing bones: A rare form of massive osteolysis. Repot of two cases, one with autopsy finding. Am J. Med. 1954 17: 623-628.
- 3: Choma ND, Biscotti CV, Bauer TW, Mehta AC, Licata AA. Gorham's syndrome: A case report and review of the literature. Am J Med 1987;83: 1151-6. [Medline].



