



Divertículos en vejiga

AUTORES

Buedo García, J.

Enfermero. Servicio de Radioterapia Hospital General de Valencia ERESA-ASCIREs.

Martínez San Juan, R.

Técnico especialista en Radioterapia y Dosimetría. Servicio de Radioterapia Hospital General de Valencia ERESA-ASCIREs.

Perruca Salvador, F.

Técnico especialista en Radioterapia y Dosimetría. Servicio de Radioterapia Hospital General de Valencia ERESA-ASCIREs.

Jorge Buedo García
Email: jorgebuedo@gmail.com

Recibido: 14/01/2018
Aceptado: 16/04/2018

Varón de 75 años que viene acude al servicio de radioterapia en marzo de 2015 diagnosticado de carcinoma de próstata. Anteriormente al TC de simulación se le han insertado 4 marcadores fiduciales en la próstata mediante ecógrafo para el tratamiento de radioterapia.

Para realizar la simulación de tratamiento el paciente orina previamente. Posteriormente antes de la realización del TC de simulación se le sonda vesicalmente para controlar la

orina residual y llenar posteriormente la vejiga con contraste diluido. Se suele retirar entre 30 y 100 ml de orina residual, en este señor se retiraron 300ml quedando orina en vejiga. Ante esta situación se le realiza unos cortes de TC a la altura de la vejiga donde descubrimos 2 divertículos en la vejiga de mayor tamaño que la vejiga.



Posteriormente el paciente fue derivado a urología para control de los divertículos.



IMÁGENES DE INTERÉS



IMÁGENES DE INTERÉS



IMÁGENES DE INTERÉS

